


Et lyskebrokk er en utposning i lysken, der indre strukturer passerer gjennom en svakhet i bukveggen. Symptomene kan være svie og ubehag, og tyngdefornemmelse er også vanlig. Ved lyskebrokk foreligger operasjonsindikasjon hos små barn og unge voksne, hos voksne kun ved samtidige smerter. Tilnærmet alle planlagte førstegangs lyskebrokk blir i dag utført dagkirurgisk i lokalanestesi og utføres som åpen kirurgi eller ved bruk av kikkhullsteknikk.



Kilde: NPR/SSB



Definisjoner

Følgende kodekombinasjoner definerer pasientgruppen:

Hoved- eller bidiagnose (ICD-10) i kategoriblokken K40 i kombinasjon med prosedyrekodene (NCSP) JAB00, JAB10, JAB11 eller JAB30 for ISF-finansierte sykehus, og de samme diagnosekodene i kombinasjon med taksten 140e for avtalespesialister.

Privat behandler er private sykehus og spesialister som har avtale om behandling med den offentlige spesialisthelsetjenesten.

	2011	2012	2013	Gj.snitt (%)
Offentlig sykehus	5 874	6 123	6 102	6 033 (95%)
Privat behandler	229	310	371	303 (5%)
Totalt	6 103	6 433	6 473	6 336 (100%)


Inngrep pr. år og gj.snitt 2011-2013

Kommentarer

Forbruket av lyskebrokkingrep er svært jevnt fordelt i den norske befolkning og en må kunne konkludere med at tilbudet er likeverdig fordelt.

Hyppigheten av inngrepet er likevel relativt stor, noe som avspeiler at lyskebrokk er ganske vanlig i befolkningen.

Operasjon for lyskebrokk, kjønns- og aldersjusterte rater pr. 100.000 innbyggere pr. boområde, gj.snitt for perioden 2011-2013 og pr. år



Kilde: NPR/SSB



Operasjon for lyskebrokk, kjønns- og aldersjusterte rater pr. 100.000 innbyggere pr. boområde, fordelt på offentlig og privat behandler, gj.snitt for perioden 2011-2013